

A beteg neve:

TAJ szám:

A beteg aláírása:

## **AZ ANESZTEZIOLÓGIAI AMBULANCIA TÁJÉKOZTATÓJA**

### **Tisztelt Betegünk!**

A tervezett műtétet megelőzően Ön először az aneszteziológiai ambulancia előkészítő munkája során, majd közvetlenül a műtét előtt találkozik osztályunk altatóorvosával.

A fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítéssel végezzük. Az érzéstelenítésben a beavatkozás idején a légzés, a keringés és egyéb szervek működésének fenntartása az érzéstelenítést végző aneszteziológus orvos feladata, a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az Ön biztonságát szolgálja.

Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet.

#### ***Általános érzéstelenítés, altatás***

A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel társul, amely az éttani alvástól különbözik és időtartama a műtét végéig tart.

A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tablettá vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. Az osztályon vagy a műtőben a kéz vénájába kanült vezetünk be, majd az altatást általában azon át adott injekcióval kezdjük el; bizonyos esetekben az altatást altatógáz belélegeztetésével kezdjük, mely altató maszkkal történik.

Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy altató gázokat adunk arcmaszk, gégemaszok illetve a légsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel, a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigén és az altatógázok keverékét.

Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az Ön alapvető élettani működésének ellenőrzésében, fenntartásában.

#### ***Helyi, regionális érzéstelenítés***

A legkisebb megterhelést jelenti, ezért ha a műtét típusa megengedi, ez választandó.

Ezt az érzéstelenítési formát maga az operáló orvos végzi, anaeszteziológus jelenléte általában nem szükséges.

A helyi érzéstelenítés közvetlenül a műtéti területbe adott érzéstelenítő injekció. A fájdalommentesség ezért kizárólag a műtét helyére korlátozódik, a beteg a műtét alatt végig éber állapotban marad. A tűszúrás és az injekció beadásával együtt járó feszítő érzés fájdalma kikerülhetetlen. Az érzéstelenítés beállta után a beteg a műtét során fájdalmat nem érez, de mivel végig éber állapotban van, folyamatosan hallja a műtői háttérzajt, a körülötte lévő hangokat, beszédet.

Módszernek vannak előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából a legmegfelelőbbet javasoljuk.

A beteg neve:

TAJ szám:

A beteg aláírása:

***Az érzéstelenítési eljárások veszélyei***

Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegnél is ritkák. Az általános érzéstelenítés (altatás), amely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, a keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

***Az altatás, általános érzéstelenítés mellékhatásai, szövődményei és veszélyei***

Gyakori : száraz torok, átmeneti zavartság, tájékozatlanság, remegés, hidegrázás

Kevésbé gyakori : hányinger, hányás, fejfájás, átmeneti látászavar, szájsérülés.

Ritkán előforduló :, gyógyszerallergia, gégegörcs, nehéz légút biztosítás, fog- és szájsérülés

Nagyon ritka: légút biztosítás kivitelezhetetlensége, véletlen ébrenlét, gépek meghibásodása, átmeneti szívmegállás, halálozás.

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG, stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

***Kérjük, hogy műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:***

- este 7 óráig vacsorázhat
- éjjelig folyadékot fogyaszthat

**A MŰTÉT REGGELÉN MÁR NE EGYEN, NE IGYON, NE KÁVÉZZON!**

- Kivehető és levehető protézisét, kontaktlencsáját távolítsa el!
- Ékszerait vegye le, sminket, körömlakkot ne használjon!
- Távolítsa el estékszerait (piercing)!
- Ha bármi kérdése lenne, azt tegye fel!

Szokásos gyógyszerei közül csak az érzéstelenítést végző orvos által elrendelteket vegye be, csupán egy korty vízzel!

Mivel erősebb nyugtató hatású gyógyszereket is szoktunk elrendelni, azok bevétele – vagy az injekció beadása – után maradjon ágyban, ne keljen fel!

Kivehető fogprotézisét, kontaktlencsáját hagyja a betegágya melletti szekrényben.

Amennyiben nagyothalló készüléke van, azt hozza magával a műtőbe, de tájékoztassa arról orvosait!

A beteg neve:

TAJ szám:

A beteg aláírása:

### ***A műtétet követően***

A műtétet követően az Ön elbocsátásának számos feltétele van.

Csak akkor bocsátjuk el, ha

- nincs sebészeti probléma
- az Ön tudata, ítélőképessége tiszta
- önállóan képes járni
- önállóan tud inni, vizeletet üríteni
- nincs hányingere
- fájdalma egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól csillapítható.

Az altatás utóhatása miatt leghamarabb csak 24 óra elteltével vehet részt aktívan az utcai forgalomban, dolgozhat gépen, fogyaszthat alkoholt; nem tanácsos szerződést vagy megállapodást kötnie.

Repülőgépre ülni a műtétet követően minimum 12 napig nem tanácsos, mielőtt ezt megtenné, konzultáljon operáló orvosával!

Étel, italt mértéktartóan fogyasszon a műtét napján. Fájdalomcsillapításra a szokványos gyógyszerei alkalmasak, ha csak az altatóorvos vagy kezelő orvos egyéb készítményt nem ajánl.

### **Kérdéseim az altatást végző orvoshoz:**

.....  
.....  
.....

**Az orvos megjegyzései (signo). A beteg személyes, egyéni kockázata aneszteziológiai szempontból; szövődmények veszélyek; a beteg kérdéseire adott válaszok; a műtéti anesztezia, a műtét elhalasztásának, lemondásának veszélyei.**

.....  
.....  
.....