

Helyi, regionális (local) érzéstelenítéssel történő egynapos sebészeti műtétről tájékoztató Tisztelt Betegünk!

A tervezett műtétet megelőzően Ön először a műtétéhez szükséges vizsgálatokat végzi el (labor, EKG)
A vizsgálatok után előre egyeztetett időpont szerint találkozik a koordinátorral, aki a leleteit illetve a betegtájékoztató dokumentációkat (amit előzőleg kitöltött és aláírt) átveszi Öntől.

Helyi, regionális érzéstelenítés

A legkisebb megterhelést jelenti, ezért ha a műtét típusa megengedi, ez választandó. Ezt az érzéstelenítési formát maga az operáló orvos végzi, anaeszteziológus jelenléte általában nem szükséges.

A helyi érzéstelenítés közvetlenül a műtét területbe adott érzéstelenítő injekció. A fájdalommentesség ezért kizárólag a műtét helyére korlátozódik, a beteg a műtét alatt végig éber állapotban marad. A túsúrás és az injekció beadásával együtt járó feszítő érzés fájdalomla kikerülhetetlen. Az érzéstelenítés beállta után a beteg a műtét során fájdalmat nem érez, de mivel végig éber állapotban van, folyamatosan hallja a műtői háttérzajt, a körülötte lévő hangokat, beszédet.

Kérjük, hogy műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket:

- reggelizzen
- rendszeresen szedett gyógyszereit vegye be, a mennyiben az operáló orvos másképpen nem rendelkezik
- ékszereit vegye le, sminket ne használjon,
- amennyiben a kéz műtétre jön a köröm és kéz ápoltságára fokozottan figyeljen
- amennyiben nagyothalló készüléke van, azt hozza magával a műtőbe, de tájékoztassa arról orvosait!
- 24 órával az műtét beavatkozás előtt alkoholt, kábítószerrel nem fogyaszthat. (Az műtét beavatkozás kockázatát fokozó tényezők.)
- A műtét előtt az egészségi állapotomba bármilyen változás lép fel arról értesítse a koordinátor vagy a operáló orvost. (Az esetlegesen zajló, lappangó betegség az anyagcsere-folyamatok módosítás révén a tervezett ellátást kockázatát fokozza.)

A műtétet követően

Lehetséges szövődmények

A szövődmény olyan váratlan esemény, amely a gyógyulás normális folyamatát megzavarja, a szokványostól eltéríti és orvosi beavatkozás nélkül az állapot rosszabbodását okozza. A legkörültekintőbb műtét beavatkozás mellett is kialakulhatnak szövődmények, ezért egy műtét szövődménymentességét egy felelősségteljes orvos sem garantálhatja. Ha a legkisebb jel arra mutat, hogy a gyógyulás nem a normális úton halad, azonnal jelezze az operáló orvos felé, aki igyekszik orvosolni ezt a problémát.

A korai szövődmények: utóvérzések, gyulladások jól kezelhetők. Ezért bármilyen csekély jelét is tapasztalja bármilyen szövődmény kialakulásának (pl. vérzés, láz) a műtét után kapott tájékoztatás szerint járjon el.

A műtétet követően az Ön elbocsátásának számos feltétele van.

Csak akkor bocsátjuk el, ha

- nincs sebészeti probléma
- az Ön tudata, ítélőképessége tiszta,
- műtét típusától függően önellátásra képes
- fájdalomla egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól csillapítható.

Az beavatkozás utóhatása miatt csak kísérelvel mehet haza.

Fájdalomcsillapításra a szokványos gyógyszerei alkalmasak, hacsak az altatóorvos vagy kezelő orvos egyéb készítményt nem ajánl.