

FELSŐ TÁPCSATORNAI TÜKRÖZÉS

(OESOPHAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA= nyelőcső-gyomor nyombél tükrözés)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

MI A GASZTROSZKÓPIA?

A felső tápcsatornai tükrözés (röviden gasztroszkópia) a jelenleg ismert legkorszerűbbvizsgálati módszer a nyelőcső, gyomor, patkóbél betegségeinek (például gyulladás, fekély rosszindulatú daganat) kórismezéséhez. A gasztroszkópos vizsgálatot endoszkópos laboratóriumokban, erre specializált, tapasztalt szakemberek végzik.

Miért van szükség gasztroszkópiára?

A korábban alkalmazott röntgen-kontrasztanyag vizsgálatához képest a gasztroszkópiaszámos, figyelemre méltó előnnyel rendelkezik: a vizsgálat során mód van a kóros eltérések *sokkal pontosabb* (videoendoszkóp esetén, a TV képernyőn is megjelenő, élethűen színes) megítélésére. Sok helyen a beteg a vizsgálatot a képernyőn önmaga is végigkövetheti, ha igényli. Még fontosabb, hogy a beavatkozás során szövettani *mintavételre van lehetőség*, amely a végleges kórszövettani diagnózis alapfeltétele. Ilyenkor annak tisztázására is lehetőség nyílik, hogy fennáll-e, olyan bakteriális fertőzés, amely a fekély kialakulásában szerepet játszhat (*Helicobacter pylori*). A gasztroszkópia további nagy előnye, hogy nem csak diagnosztikus, hanem további *gyógyító tevékenységre is alkalmas* (pl. feistápcsatornai vérzés csillapítása, polip eltávolítása, lenyelt idegentest kiemelésére).

Hogyan kell a betegeknek felkészülnie a vizsgálatra?

A gasztroszkópia *éhgymorra* történik, ezért a beavatkozás napján, a vizsgálat előtt sem szilárd, sem folyékony étel nem fogyasztható. A *dohányzás is kerülendő*, mert jelentősen növeli a gyomor savelválasztását.

Hogyan történik a vizsgálat?

A beavatkozás során, a garat helyi érzéstelenítését követően, egy ujjnyi vastag, hajlékony optikai eszközt (a gasztroszkópot) vezetnek le a szájon át a nyelőcsőbe, majd a gyomron keresztül a nyombélbe. A vizsgálat, a beteg megfelelő együttműködése mellett-csupán néhány percig tart, fájdalommentes, jól tolerálható, de amennyiben a beteg igényli, előzetes nyugtató inekciót is kaphat. A vizsgálatnál együtt járó hányingert mély lélegzésekkel, sóhajokkal lehet leküzdeni. Mivel az eszköz nem a légutakba kerül, ezért zavartalanul fog tudni lélegezni. A tükrözés tapasztalt szakemberek kezében gyakorlatilag szövődménymentes, de, mint ahogy minden orvosi beavatkozásra, úgy a gasztroszkópiára is érvényes, hogy igen ritkán (kb.10 000 vizsgálatból 1 esetben) előfordulhatnak szövődmények: az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató inekció iránti túlérzékenység, műszer okozta sérülés, a szövettani mintavétel után esetleg kisebb vérzés alakulhat ki.

Mi a teendő vizsgálat után ?

A gasztroszkópiát követő 1 órán belül nem szabad étkezni, mert a garatérzéstelenítés miatt megnő a férenyelés veszélye. Egyébként a beteg akadálytalanul folytathatja a napi rutin tevékenységét, munkáját. Ha a beteg nyugtató inekcióban is részesült, a vizsgálat napján gépkocsit nem vezethet a reakcióképesség csökkenése, a reflex megromlása miatt. Szokatlan panasz esetén forduljon vizsgáló orvosához.

Amennyiben vizsgálatnál kapcsolatban egyéb kérdése felmerülne vagy további felvilágosítást igényelne, forduljon bizalommal kezelőorvosához vagy a gasztroszkópiát végző orvoshoz.

Beleegyezési nyilatkozat

A betegtájékoztató elolvasása és a szóbeli tájékoztatás után a javasolt endoszkópos vizsgálatba beleegyezem.

..... 200:.....

.....
vizsgáló orvos

.....
beteg